

血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種（筋肉注射）にあたっての注意点



接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象の
お薬

抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

| 商品名 | 一般名 |
|--------|----------------|
| ワーファリン | ワルファリンカリウム |
| プラザキサ | ダビガトランエテキシラート |
| イグザレルト | リバーロキサバン |
| エリキュース | アピキサバン |
| リクシアナ | エドキサバントシル酸塩水和物 |

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、
通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

| 商品名 | 一般名 | 商品名 | 一般名 |
|---------|-------------------|-------------|------------------|
| バイアスピリン | アスピリン | コンプラビン配合錠 | アスピリン・クロピドグレル硫酸塩 |
| パナルジン | チクロピジン塩酸塩 | タケルダ配合錠 | アスピリン・ランソプラゾール |
| プラビックス | クロピドグレル硫酸塩 | エパデール | イコサペント酸エチル(EPA) |
| エフィエント | プラスグレル塩酸塩 | ドルナー、プロサイリン | ベラプロストナトリウム |
| プレタール | シロスタゾール | アンプラーグ | サルポグレート塩酸塩 |
| バファリン | アスピリン・ダイアルミネート配合剤 | | |
| ブリリント | チカグレロル | | |

など